



Escuela de Educación Técnico Profesional N° 602

"Gral. San Martín"

Espacio curricular: Matemática

Curso: 2^{to} Año "A"

Horas semanales: 5 hs

Profesora: Herrero Marisa

Correo electrónico: marisa36herrero@gmail.com

WhatsApp: (3462) 662629

Ciclo lectivo: 2020

Revisión de operaciones en el conjunto de números enteros (Z)

1) Resolver las siguientes sumas y restas de números enteros.

a. $(-30) + (-20) =$	d. $-50 + 80 =$	g. $-40 + 5 =$
b. $-7 + (-13) =$	e. $6 + (-6) =$	h. $-60 + 100 =$
c. $2 + (-12) =$	f. $200 + (-150) =$	i. $-199 + (-1) =$

2) Resolver las siguientes multiplicaciones y divisiones de números enteros.

a. $(+5) \cdot (-3) =$	e. $(-5) \cdot (-4) =$	i. $(-4) : (-2) =$
b. $4 \cdot (-9) =$	f. $(-957) \cdot 0 =$	j. $0 : (-47) =$
c. $(-2) \cdot (+7) =$	g. $18 : (-6) =$	k. $-15 : (-15) =$
d. $(-6) \cdot 8 =$	h. $-24 : 8 =$	l. $50 : (-50) =$

! Fíjate bien

$++ = ++$
 $-- = ++$
 $+ - = -$
 $- + = -$

3) Resolver las siguientes potencias.

a. $9^2 =$	d. $(-9)^2 =$	g. $0^{29} =$	j. $-7^0 =$
b. $(-2)^3 =$	e. $-9^2 =$	h. $(-1)^{14} =$	k. $(-2)^4 =$
c. $(-10)^4 =$	f. $(-1)^{13} =$	i. $-10^3 =$	l. $-2^4 =$

$(-4)^2$ es distinto de -4^2

$(-4) \cdot (-4) \neq -(4 \cdot 4)$
 $16 \neq -16$

4) Usá propiedades y escribí cada resultado como una potencia de -2.

- a. $(-2)^4 \cdot (-2)^3 =$
- b. $(-2)^9 : (-2)^4 =$
- c. $(-2)^8 \cdot (-2)^0 =$
- d. $(-2)^{13} : (-2)^0 =$
- e. $[(-2)^3]^5 : (-2)^{13} =$
- f. $[(-2)^4]^3 \cdot (-2)^2 =$

Propiedades de las potencias

- **Producto de potencias de igual base**
 $(-3)^7 \cdot (-3)^2 = (-3)^9$ ← Se **suman** los exponentes.
- **Cociente de potencias de igual base**
 $(-3)^7 : (-3)^2 = (-3)^5$ ← Se **restan** los exponentes.
- **Potencia de otra potencia**
 $[(-3)^7]^2 = (-3)^{14}$ ← Se **multiplican** los exponentes.
- **Propiedad distributiva**
 $[(-4) \cdot 8]^2 = (-4)^2 \cdot 8^2$ $[21 : (-7)]^2 = (21)^2 : (-7)^2$

5)

a. $(-3)^2 \cdot (-3)^3 =$

b. $15^9 : 15^7 =$

c. $(-4)^2 \cdot (-4) =$

d. $10^7 \cdot 10^0 =$

e. $(-10)^6 : (-10)^0 =$

f. $[(-4)^2]^2 =$

g. $5 \cdot (5^3)^2 =$

h. $(9^7 : 9^5)^2 =$

6) Calculá las raíces. ¡No vale usar la calculadora!

a. $\sqrt{144} =$

e. $\sqrt[3]{0} =$

i. $\sqrt[4]{(-36)^2} =$

b. $\sqrt[3]{343} =$

f. $\sqrt[4]{10.000} =$

j. $\sqrt[3]{-64} =$

c. $\sqrt[4]{81} =$

g. $\sqrt[5]{-243} =$

k. $\sqrt[5]{-100.000} =$

d. $\sqrt[3]{-1} =$

h. $\sqrt{(-13)^2} =$

l. $\sqrt[6]{(-125)^2} =$

7) Calculá las raíces. Cuando se pueda, aplicá propiedades.

a. $\sqrt{49 \cdot 100} =$

e. $\sqrt[6]{-(8^2) \cdot (-1)} =$

b. $\sqrt[3]{-1.000 : (-125)} =$

f. $\sqrt[4]{256} =$

c. $\sqrt{(-25) \cdot 9 \cdot (-100)} =$

g. $\sqrt{\sqrt[3]{(-64) \cdot (-1)}} =$

d. $\sqrt[2]{(-128) : (-1)} =$

h. $\sqrt[3]{\sqrt{-512}} =$

8) Separar en términos y resolver las siguientes operaciones combinadas.

a. $\sqrt[3]{(-8)} - 5^2 : \sqrt[2]{-1} + (2-5)^3 =$

e. $-\sqrt{36} + \sqrt[3]{-125} : (-1)^9 - (13-15)^4 : 8 + 8 =$

b. $\sqrt{-2^2 \cdot (-9)} - (-5 \cdot 8) : (-40)^0 + \sqrt[4]{16} =$

f. $\sqrt[3]{-200 - (-2)^4} + 26 : (26 - 3^3) =$

d. $\sqrt{-[1 + 20 \cdot (-2)^2] : (-1 - 2^3)} + 6 : (-3) =$

El conjunto de los Números Racionales (Q)

Un número racional es una expresión de la forma $\frac{a}{b}$, donde a y b son números enteros con b distinto de cero.

Todo **número racional** se puede escribir como una **expresión decimal**. Para encontrar la expresión decimal se puede dividir el numerador por el denominador.

Ejemplos:

Expresión decimal finita o exacta: tiene un número finito de cifras decimales.

$$\frac{2}{5} = 2 : 5 = 0,4$$

Expresión decimal periódica: tiene cifras decimales que se repiten infinitamente.

Pura ←

→ **Mixta**

$$\frac{8}{11} = 0,7272 \dots = 0,7\widehat{2}$$

$$-\frac{5}{12} = -5 : 12 = 0,41\widehat{6}$$

Después de la coma aparece el período

Después de la coma aparece/en números que no son periódicos y luego aparece el período.

Toda **expresión decimal** se puede escribir como **fracción**, de la siguiente manera:

Ejemplos:

$$0,38 = \frac{38}{100} = \frac{19}{50} \longrightarrow \text{Fracción irreducible}$$

$$0,10 = \frac{1}{10} \longrightarrow \text{Fracción decimal: cuando el denominador es 10, 100, 1000, etc.}$$

Dos **fracciones son equivalentes** cuando representan el mismo número racional.



Para obtener fracciones equivalentes se pueden usar los siguientes procedimientos

AMPLIFICACIÓN ←

→ SIMPLIFICACIÓN

5) Pasá estas expresiones decimales a fracción. Después simplificalas hasta obtener una fracción irreducible, es decir, hasta que ya no puedan seguir simplificándose.

a. $0,6 =$

d. $5,25 =$

b. $1,8 =$

e. $18,64 =$

c. $2,3 =$

f. $-135,75 =$

6) Pasá a fracción las siguientes expresiones decimales periódicas. Verificá con la calculadora. Después simplificalas hasta hacerlas irreducibles.

a. $0,\widehat{7} =$

e. $24,15\widehat{7} =$

b. $3,\widehat{6} =$

f. $35,02\widehat{5} =$

c. $-2,\widehat{54} =$

g. $-21,16\widehat{45} =$

d. $-1,1\widehat{7} =$

h. $34,00\widehat{7} =$

Fijate bien

A las expresiones decimales periódicas se las menciona simplemente como "números periódicos".

7) Completá los numeradores o denominadores faltantes para que se verifique cada igualdad.

a. $0,4 = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{35} = \frac{\dots}{105} = \frac{56}{\dots} = \frac{\dots}{1.400}$

b. $1,8 = \frac{\dots}{5} = \frac{\dots}{55} = \frac{18}{\dots} = \frac{\dots}{350}$

c. $0,5\widehat{3} = \frac{24}{\dots} = \frac{96}{\dots} = \frac{\dots}{15} = \frac{16}{\dots}$


d. $-0,0\widehat{5} = -\frac{35}{\dots} = \frac{\dots}{90} = -\frac{700}{\dots} = \frac{\dots}{450}$

Fijate bien


Recordá que dos fracciones son equivalentes cuando, al dividir el numerador por el denominador, se obtiene la misma expresión decimal.

8) Completá la tabla señalando qué letra corresponde a cada número, según su ubicación en la recta numérica.

Número	$\frac{1}{2}$	-0,25	$\frac{12}{5}$	-1,5	$\frac{3}{2}$	-2,7
Letra						



Para representar fracciones en la recta numérica, se deben buscar fracciones equivalentes a las que se quiere representar, con igual denominador. Luego, se divide a cada unidad en tantas partes como indica el denominador.




Representá los siguientes números racionales en la recta numérica.

9)

- $\frac{4}{3}$ $-\frac{15}{6}$ $0,\widehat{3}$ $-0,5$ $-\frac{5}{2}$ $-1,\widehat{6}$ $3,5$

Fijate bien

Para representar todas las fracciones en la misma recta, te puede resultar más fácil si encontrás fracciones equivalentes a las que tenés que representar, todas con el mismo denominador.



Adicción y sustracción de Números Racionales:

Para sumar (o restar) fracciones con el mismo denominador, se suman (o restan) los numeradores y se escribe el mismo denominador.

Ejemplos:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

$$\frac{6}{7} - \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$$

Para sumar (o restar) fracciones con distinto denominador, se reemplazan las fracciones por fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador.

Para encontrar un denominador común, se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores.

Ejemplos:

$$\frac{3}{4} + \frac{1}{10} = \frac{15}{20} + \frac{2}{20} = \frac{17}{20}$$

$$\frac{4}{3} - \frac{3}{5} = \frac{20}{15} - \frac{9}{15} = \frac{11}{15}$$

Si un cálculo tiene fracciones y expresiones decimales, se deben pasar las expresiones decimales a fracción para resolverlo.

Ejemplos:

$$\frac{1}{6} + 0,7 = \frac{1}{6} + \frac{7}{10} = \frac{5}{30} + \frac{21}{30} = \frac{26}{30} = \frac{13}{15}$$

$$0,4 - \frac{1}{4} = \frac{4}{10} - \frac{1}{4} = \frac{16}{40} - \frac{10}{40} = \frac{6}{40} = \frac{3}{20}$$



Actividades:

10) Resolver mentalmente.

a. $\frac{5}{6} + \frac{11}{6} = \boxed{\quad}$

c. $4\frac{3}{7} + 5\frac{2}{7} = \boxed{\quad}$

e. $3 + \frac{4}{3} = \boxed{\quad}$

b. $\frac{22}{6} - \frac{15}{6} = \boxed{\quad}$

d. $\frac{4}{3} - \frac{5}{6} = \boxed{\quad}$

f. $5 - \frac{9}{2} = \boxed{\quad}$

11) completar los siguientes cálculos y verificar las igualdades.

a. $\frac{3}{4} + \boxed{\quad} = \frac{9}{4}$

e. $3,521 + \boxed{\quad} = 3,846$

b. $\boxed{\quad} + \frac{4}{10} = \frac{4}{5}$

f. $\boxed{\quad} + 1,678 = 4,205$

c. $\frac{14}{12} - \boxed{\quad} = \frac{3}{4}$

g. $10,470 - \boxed{\quad} = 5,822$

d. $\boxed{\quad} - \frac{3}{5} = \frac{7}{6}$

h. $\boxed{\quad} - 7,841 = 3,916$

12) Resolver y expresar el resultado como fracción irreducible.

a. $\frac{8}{3} + \frac{4}{5} - \frac{5}{2} = \boxed{\frac{29}{30}}$

d. $(2,5 - 1\frac{3}{4}) - (1,6 - \frac{7}{2}) = \boxed{\frac{53}{20}}$

b. $6\frac{3}{4} - \frac{5}{2} + \frac{1}{8} = \boxed{\frac{35}{8}}$

e. $2,5 - (\frac{2}{5} + 2\frac{7}{3}) + 2,5 = \boxed{\frac{29}{90}}$

c. $\frac{17}{4} - (\frac{7}{2} + \frac{1}{3}) = \boxed{\frac{5}{12}}$

f. $3,75 + \frac{3}{8} - (0,7 + 2\frac{1}{5}) = \boxed{\frac{49}{40}}$

13) Leer atentamente y resolver.

Juliana gastó $\frac{2}{5}$ de sus ahorros en el supermercado y $\frac{3}{7}$ de sus ahorros en ropa.

- a. ¿Qué parte de sus ahorros gastó en total?
- b. ¿Qué parte le quedó?
- c. ¿Gastó más en el supermercado o en ropa? _____

MENTE Activada

Tres hermanos abrieron un restaurante; cada uno aportó una parte.

El mayor tiene $\frac{8}{17}$ del restaurante y el del medio, $\frac{5}{13}$.

¿Qué parte del restaurante es del otro hermano?